

大腸がん①

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mFOLFOX6 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
CAPOX 〈21〉	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
SOX 〈21〉	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	テガフル・キメシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
FOLFIRI 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mCAPIRI 〈21〉	イリノテカン注	200 mg/m ²	1時間30分	1	
	カペシタビン	1600 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
sLV5FU2 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
FOLFIRI+Aflibercept 〈14〉	アフリベルセプト注	4 mg/kg	1時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mFOLFOX6+ Bevacizumab 〈14〉	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
CAPOX+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
SOX+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	テガフル・キメシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
FOLFIRI+Bevacizumab 〈14〉	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	

大腸がん②

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mCAPIRI+Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	イリノテカン注	200 mg/m ²	1時間30分	1	
	カペシタビン	1600 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
SIRB (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
sLV5FU2+Bevacizumab (14)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Capecitabine+ Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
S1+Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (導入療法) (14)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチン・レボホリナート 同時投与
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	48時間	1-3	
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (維持療法) (14)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	3200 mg/m ²	48時間	1-3	
FTD/TPI+ Bevacizumab (28)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1,15	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩	35 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-5,8-12	
mFOLFOX6+ Bevacizumab(10mg/kg) (14)	ベバシズマブ注	10 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
FOLFIRI+ Bevacizumab(10mg/kg) (14)	ベバシズマブ注	10 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	

大腸がん③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
IRI+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注 イリノテカン注	500 mg/m ² 150 mg/m ²	2時間 1時間30分	1 1	
FOLFIRI+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mFOLFOX6+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
sLV5FU2+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	400 mg/m ² 300 mg 90 mg	2時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (②クール目以降) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	250 mg/m ² 300 mg 90 mg	1時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	400 mg/m ² 300 mg	2時間 分1:朝食後	1 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (②クール目以降) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	250 mg/m ² 300 mg	1時間 分1:朝食後	1 連日服用	

大腸がん④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
CPT-11+Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注 イリノテカン注	6 mg/kg 150 mg/m ²	1時間 1時間30分	1 1	
mFOLFOX6+ Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
FOLFIRI+Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
sLV5FU+Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
FOLFIRI+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与