

非小細胞肺癌①

レジメン名 <1クール日数>	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
PEM <21>	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
DTX <21>	ドセタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1	
weeklynabPTX <21>	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
GEM <28>	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
VNR <28>	ビノレルビン注	25 mg/m ²	全開で自然滴下	1,8,15	
weeklyIRI <28>	イリノテカン注	100 mg/m ²	1時間30分	1,8,15	
AMR <28>	アムルピシン注	45 mg/m ²	全開で自然滴下	1,2,3	
CBDCA+PEM <21>	ペメトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/m ² AUC=6	10分 1時間	1 1	
CBDCA+PTX <21>	パクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/m ² AUC=5	3時間 1時間	1 1	
CBDCA +weeklynabPTX <21>	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	100 mg/m ² AUC=6	30分 1時間	1,8,15 1	
CBDCA+DTX <21>	ドセタキセル注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	1 1	
CBDCA+GEM <21>	ゲムシタビン注 カルボプラチン注	1000 mg/m ² AUC=5	30分 1時間	1,8 1	
CBDCA+VNR <21>	ビノレルビン注 カルボプラチン注	25 mg/m ² AUC=5	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CBDCA+IRI <28>	イリノテカン注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間30分 1時間	1,8,15 1	
CBDCA+S1 <21>	カルボプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 80 mg/m ²	1時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
CDDP+PEM (short-hydration) <21>	ペメトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/m ² 75 mg/m ²	10分 1時間	1 1	

非小細胞肺癌②

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+GEM (short-hydration) <21>	ゲムシタビン注 シスプラチン注	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 1時間	1,8 1	
CDDP+VNR (short-hydration) <21>	ビノレルビン注 シスプラチン注	25 mg/m ² 80 mg/m ²	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CDDP+S1 (short-hydration) <35>	シスプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	60 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間 分2:朝夕食後	8 1-21 (3投2休)	
Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
PEM+Bevacizumab <21>	ペトレキセド注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² 15 mg/kg	10分 1時間30分	1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Gefitinib+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 ゲフィチニブ	15 mg/kg 250 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
DTX+Bevacizumab <21>	ドセタキセル注 ベバシズマブ注	50 mg/m ² 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Afatinib+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 アファチニブ	15 mg/kg 40 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Erlotinib+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 エルロチニブ	15 mg/kg 150 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
weeklynabPTX+ Bevacizumab <21>	nabパクリタキセル注 ベバシズマブ注	100 mg/m ² 15 mg/kg	30分 1時間30分	1,8,15 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PTX+ Bevacizumab <21>	パクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	200 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	3時間 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PEM+ Bevacizumab <21>	ペトレキセド注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+S1+ Bevacizumab <21>	カルボプラチン注 ベバシズマブ注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 15 mg/kg 80 mg/m ²	1時間 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+weeklynabPTX+ Bevacizumab <21>	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	100 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	30分 1時間 1時間30分	1,8,15 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可

非小細胞肺癌③

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM+ Bevacizumab (short-hydration) (21)	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
CDDP+GEM+ Bevacizumab (short-hydration) (21)	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	シスプラチン注	80 mg/m ²	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
DTX+Ramucirumab (21)	ラムシルマブ注	10 mg/kg	1時間	1	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ドセタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1	
Gefitinib+Ramucirumab (14)	ラムシルマブ注	10 mg/kg	1時間	1	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ゲフィチニブ	250 mg/body	1日1回	連日服用	
Erlotinib+Ramucirumab (14)	ラムシルマブ注	10 mg/kg	1時間	1	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
	エルロチニブ	150 mg/body	1日1回	連日服用	
S1+GEM (21)	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	8,15	
	テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	60 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
GEM+VNR (28)	ビノレルビン注	25 mg/m ²	全開で自然滴下	1,8,15	
	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
CDDP+PEM+ Osimertinib (short-hydration) (21)	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
	オシメルチニブ	80 mg/body	1日1回	連日服用	
CBDCA+PEM+ Osimertinib (21)	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
	オシメルチニブ	80 mg/body	1日1回	連日服用	
PEM+ Osimertinib (21)	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	オシメルチニブ	80 mg/body	1日1回	連日服用	
CDDP+GEM+ Necitumumab (short-hydration) (21)	ネシツムマブ注	800 mg/body	1時間	1,8	
	ゲムシタビン注	1250 mg/m ²	30分	1,8	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
Necitumumab (維持療法) (21)	ネシツムマブ注	800 mg/body	1時間	1,8	

非小細胞肺癌④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Nivolumab(q2weeks) 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) 〈28〉	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab(q3weeks) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab(q6weeks) 〈42〉	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	30分	1	
Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	2回目以降30分に短縮可
Durvalumab 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
Ipilimumab+ Nivolumab(q2weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Ipilimumab+ Nivolumab(q3weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法1) 〈56〉	デュルバルマブ注 トレメリムマブ注	1500 mg/body 75 mg/body	1時間 1時間	1,29 29	1クール施行後は維持療法2 へ デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法2) 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg

非小細胞肺がん⑤

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+weeklynabPTX+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	nab/パクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CBDCA+PEM+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
CDDP+PEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
PEM+Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
術前CDDP+GEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
CBDCA+PTX+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,2,2	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m ²	3時間	1,2,2	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1,2,2	
CBDCA+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,2,2	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1,2,2	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1,2,2	
CDDP+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab (short-hydration) 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,2,2	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1,2,2	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1,2,2	
術前CBDCA+PTX +Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m ²	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
術前CBDCA+PEM+ Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
術前CDDP+PEM+ Nivolumab (short-hydration) 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	

非小細胞肺癌⑥

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+weeklynabPTX +Atezolizumab (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
ABCP (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ヘパシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
	パクリタキセル注	175 mg/m ²	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CDDP+PEM+ Atezolizumab (short-hydration) (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
CBDCA+PEM+ Atezolizumab (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
PEM+Atezolizumab (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
Atezolizumab +Bevacizumab (21)	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ヘパシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
CBDCA+weeklynabPTX +Durvalumab +Tremelimumab (21)	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4サイクル施行後は維持療法1へ デュルバルマブ:体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CBDCA+PEM +Durvalumab +Tremelimumab (21)	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4サイクル施行後は維持療法1へ デュルバルマブ:体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CDDP+PEM+Durvalumab +Tremelimumab (short-hydration) (21)	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4サイクル施行後は維持療法1へ デュルバルマブ:体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	ペトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	